


# Commission Pharmacie



JP Collinot, B Demoré

26 janvier 2006

# Commission Pharmacie début 2005



**Hôpital**

**Ville**



Suivi prospectif des  
consommations  
d'antibiotiques

Visites  
de  
pairs

**Quels axes de travail pour la suite ?**

# Suivi consommations d'antibiotiques

2004

- Suivi de tous les antibiotiques
- Regroupement des services  
MCO / Réanimation / SSR / SLD / Psy
- Indicateur : DDJ / 100 JH
- Données 2003 et début 2004



**Expérience poursuivie en 2004-2005**  
**Saisie** sur le site Antibiolor  
Obtention instantanée de **graphiques**



**ANTIBIOLOR**  
Le réseau lorrain d'antibiologie

BULLETIN D'ADHÉSION ←

vous e-mail ici  VALIDER

- ACCUEIL
- LE RÉSEAU
- CLINIQUE
- INFORMATIQUE
- BIOLOGIE
- INFORMATION & FORMATION
- PHARMACIE
- ACTUALITÉS & DOSSIERS
- ESPACE MEMBRES
- SERVICES
  - Saisie des consommations
  - Périodes
  - Collecte des données

**ANTIBIOLOR**

est un réseau de professionnels de santé. Son objet est le bon usage des antibiotiques :

"Pour un traitement optimal des patients dans le respect de l'écologie bactérienne".

**ANTIBIOLOR**  
LE RESEAU LORRAIN D'ANTIBIOLOGIE



PLAN DU SITE NOUS CONTACTER  mot clef ici RECHERCHER

## COLLECTE DES DONNÉES

**Assistant de saisie des consommations d'antibiotique.**  
**Services :**  
**période : 1er semestre 2004 (du 01/01/2004 au 31/05/2004)**

Nombre de lits :

Journées d'hospitalisation :

» Pénicillines Étape 01 (Pénicillines) / 22


MOLÉCULES	VOIE D'ADM.	DOSAGE	NB. UNITÉS	EN GRAMMES	DDJ EN G (WHO)	TOTAL DE DDJ	DDJ/100JH
Amoxicilline	Orale	0,50	<input type="text" value="1,00"/>	0	1	0,0	0,0
		0,00	<input type="text" value="2,00"/>	0			
	Parentérale	0,00	<input type="text" value="3,00"/>	0	1	0,0	0,0
		0,00	<input type="text" value="4,00"/>	0			
		0,00	<input type="text" value="5,00"/>	0			
Amoxicilline + acide clavulanique	Orale	0,50	<input type="text" value="6,00"/>	0	1	0,0	0,0

**OPTIONS**

**GRAPHIQUE PAR FAMILLE ET PAR ACTIVITÉ**

établissements	Sélec.
CH Briey-MCO	<input type="checkbox"/>
CH Briey-Psy	<input type="checkbox"/>
CH Briey-Rea	<input type="checkbox"/>
CH Briey-SLD	<input type="checkbox"/>
CH Briey-SSR	<input type="checkbox"/>
CHU Nancy-MCO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHU Nancy-Psy	<input type="checkbox"/>
CHU Nancy-Rea	<input checked="" type="checkbox"/>
CHU Nancy-SLD	<input type="checkbox"/>
DHS Flavigny-SSR	<input type="checkbox"/>


Famille	Sélec.
Pénicillines	<input checked="" type="checkbox"/>
C1G	<input checked="" type="checkbox"/>
C2G	<input checked="" type="checkbox"/>
C3G	<input type="checkbox"/>
Monobactam	<input type="checkbox"/>
Céphamycines	<input type="checkbox"/>
Carbapénèmes	<input type="checkbox"/>
Sulfamides	<input type="checkbox"/>
Aminosides	<input type="checkbox"/>
Macrolides	<input type="checkbox"/>
Synergistines	<input type="checkbox"/>
Lincosanides	<input type="checkbox"/>
Tétracyclines	<input type="checkbox"/>



- Pénicillines
- C1G
- C2G
- C3G
- Monobactam
- Céphamycines
- Carbapénèmes
- Sulfamides
- Aminosides
- Macrolides
- Synergistines
- Lincosanides
- Tétracyclines
- Quinolones urinaires
- Fluoroquinolones
- Glycopeptides
- Oxazolidinones
- Polymyxines
- Nitro-imidazolés
- Anti-tuberculeux
- Antibactériens urinaires
- Autres

# Aspect organisationnel du réseau

- Réseau de santé : un système innovant **complexe**
  - 3 facettes à envisager selon triangulation de Le Moigne



- Étude auprès d'une population du réseau : **pharmaciens**
- **Identification des besoins/attentes** des pharmaciens ville/hôpital

# Pôle génétique...Ce que devient le réseau

## ➤ Réalisation de **2 enquêtes**

➤ Pharmaciens hospitaliers et d'officine

➤ Méthode **Delphi-Régnier**

– Résultats visuels : « **Tableaux images** »

– Mise en évidence consensus/disensus

## ➤ **Envoi du questionnaire**

– Hospitaliers : mail/courrier (23/29 adhérents)

– Officine : CERP (500/753 pharmacies en Lorraine)


Taux participation

70 % hospitaliers et 30 % officinaux


# Pharmaciens hospitaliers








Corrélation entre établissements comparables et consommations d'antibiotiques






Profil d'établissements comparables

... mais utilisation différente des molécules au sein d'une même famille d'antibiotique


Ofloxacine > Ciprofloxacine

Ofloxacine < Ciprofloxacine



Ofloxacine Ciprofloxacine Norfloxacine Péfloxacine  
Lévofloxacine Moxifloxacine

# Pharmaciens d'officine




# Perspectives

## Ville



- Visite de pairs à poursuivre
- Documents : "non-prescription"...
- Cas cliniques multi-disciplinaires



## Hôpital

- Suivi des consommations
  - Inclure les nouveaux adhérents
- Comparaison entre établissements
  - Des consommations...aux pratiques
- Soirées de formation