

Tableau de recommandations de bon usage des Antifongiques (d'après recommandations AFSSAPS 2008)

	<i>Aspergillose disséminée ou profonde</i>	<i>Candidose disséminée ou profonde</i>	<i>Traitement préemptif des candidoses invasives en réanimation</i>	<i>Traitement empirique chez le neutropénique fébrile</i>	<i>Prophylaxie primaire en Onco-hématologie</i>	<i>Prophylaxie secondaire des infections fongiques chez immunodéprimé (hématologie ; greffé)</i>	<i>Autres</i> - <i>Leishmaniose</i> - <i>Mucormycose</i> - <i>Cryptococcose</i> - <i>Histoplasmosse (VIH)</i>
Indications du fluconazole (Triflucan®)		Oui (AMM) si Candida fluco S : ttt de 1 ^{ère} intention	Oui si tableau peu sévère et pas d'exposition antérieure	Oui si tableau peu sévère et pas d'exposition antérieure	Oui (AMM)		Cryptococcose
AMM	V Fend® - A** et E* > 12 ans : 6 mg/kg/12h à J1 puis 4 mg/kg/12h - E* de 2 à 12 ans : IV : 7 mg/kg/12h VO : 200 mg/12h	Ambisome® (si candida flucoR *** et insuffisance rénale) A** et E*		Ambisome® (si agents néphrotoxiques associés)	Noxafil® 200 mg x 3/j		Ambisome® - Leishmaniose - Cryptococcose
	Ambisome® - E* : 3 mg/kg/24h - A** : 3 mg/kg/24h	V Fend® (si candida flucoR)					V Fend® - Scedosporium - Fusarium
	Si échec ou intolérance à AmB, Ambisome, itraconaz. Cancidas® - A** : 70 mg à J1 puis 50 mg (> 80 kg : 70 mg) Ou Noxafil® - A** : 400 mg x 2/j	Cancidas® (si candida flucoR)*** - A** : 70 mg à J1 puis 50 mg (> 80 kg : 70 mg)		Cancidas® - A** : 70 mg à J1 puis 50 mg (> 80 kg : 70 mg)			Noxafil® - Fusariose - Chromoblastomycose - Mycétome - Coccidioïdomycose
Situations temporairement acceptables = Protocoles Temporaires de Traitement	Si échec, intolérance ou contre-indication au voriconazole en alternative au posaconazole Cancidas® - A** : 70 mg à J1 puis 50 mg (> 80 kg : 70 mg)	C. oesophagienne si résistance, intolérance ou contre-indication au fluconazole V Fend® si résistance, intolérance ou contre-indication à amphoB, keto, fluco, itra et voriconazole Cancidas®	Ambisome® Cancidas®			V Fend® Si contre-indication ou échec d'un azolé : - Fluco pour candidose - Vorico pour aspergillose Ambisome® Cancidas®	Ambisome® Mucormycose 10 mg/kg/j Ambisome® Histoplasmosse (VIH) 3 mg/kg/j
Situations hors AMM (données insuffisantes pour évaluer le rapport bénéfice / risque)	Association d'antifongiques si aspergillose probable ou documentée avec signes majeurs de gravité				Ambisome® Cancidas® V Fend®		
Situations non acceptables	Cancidas® Aspergillose invasive en 1 ^{ère} intention			V Fend®			

* E = Enfant ** A = Adulte *** = Proposition conférence consensus