

# Nouvelles recommandations vaccinales contre la Covid-19 à compter du 12 avril 2021



Professeur Thierry MAY,

# Recommandations selon l'âge

Vaccination possible dès l'âge de 55 ans pour toute la population.

## Quel vaccin selon l'âge ?

|  |   |   |
|--|---|---|
| Jusqu'à 54 ans<br>en présence de pathologie<br>à très haut risque* | Vaccin ARNm<br>(Pfizer ou Moderna)  |   |
| A partir de 55 ans   | en absence de pathologie<br>à très haut risque<br>Vaccin à vecteur adénovirus<br>(AstraZeneca ou Janssen) | en présence de pathologie<br>à très haut risque*<br>Vaccin à vecteur adénovirus<br>ou vaccin ARNm |

\* Traitement par chimiothérapie, transplanté, dialysé, poly-pathologies...

| Mon âge                   | Ma situation   | AstraZeneca  | Pfizer-BioNTech ou Moderna  |
|---------------------------|--|--|---|
| <b>0 à 17 ans</b>         |  | Je ne suis pas concerné  |   |
| <b>18 à 49 ans inclus</b> | Je n'ai pas de problème de santé   | Pour l'instant, je ne peux pas me faire vacciner   |   |
|                           | J'ai une pathologie à très haut risque de forme grave de COVID-19*   |  | ✓<br>En centre de vaccination avec une prescription médicale de mon médecin traitant ou sur mon lieu de soin  |
| <b>50 à 54 ans inclus</b> | Je n'ai pas de problème de santé   | Pour l'instant, je ne peux pas me faire vacciner   |   |
|                           | J'ai un risque de forme grave de COVID-19*<br>J'ai une pathologie à très haut risque de forme grave de COVID-19* |  | ✓<br>En centre de vaccination<br>✓<br>En centre de vaccination avec une prescription médicale de mon médecin traitant ou sur mon lieu de soin             |
| <b>55 à 69 ans inclus</b> | Je n'ai pas de problème de santé   | Pour l'instant, je ne peux pas me faire vacciner   |   |
|                           | J'ai un risque de forme grave de COVID-19*<br>J'ai une pathologie à très haut risque de forme grave de COVID-19* | ✓<br>Chez mon médecin traitant ou médecin du travail ou sur mon lieu de soin ou en pharmacie<br>✓<br>Chez mon médecin traitant ou médecin du travail ou sur mon lieu de soin ou en pharmacie | ✓<br>Désormais, je peux me faire vacciner<br>✓<br>En centre de vaccination avec une prescription médicale de mon médecin traitant ou sur mon lieu de soin |
| <b>Plus de 70 ans</b>     | Je suis en établissement pour personnes âgées  | ✓<br>Chez mon médecin traitant ou sur mon lieu de soin ou au sein de mon établissement ou en pharmacie   | ✓<br>Au sein de mon établissement   |
|                           | Je vis à domicile (ou dans une autre structure)  | ✓<br>Chez mon médecin traitant ou sur mon lieu de soin ou en pharmacie   | ✓<br>En centre de vaccination   |

**N.B. :** Les personnes majeures en situation de handicap, hébergées en maison d'accueil spécialisée ou foyer d'accueil médicalisé, se font vacciner au sein de leur établissement.



# Qui et comment vacciner ?

## La vaccination POUR LES PROFESSIONNELS

(à partir de 18 ans conformément aux autorisations de mise sur le marché de ces vaccins)

\* Liste des professionnels sur [solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19](https://solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19)

| Mon âge   | Avec quels vaccins ?  |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>DE 18 À 54 ANS INCLUS</b>  | <b>Pfizer-BioNTech ou Moderna</b><br>✓<br>En centre de vaccination ou dans mon établissement  |   |  |
| <b>55 ANS ET PLUS</b>   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <b>AstraZeneca</b><br/>                     ✓<br/>                     En centre de vaccination ou dans mon établissement ou chez mon médecin traitant ou en pharmacie<br/> <small>(sauf si une 1<sup>ère</sup> injection a été réalisée avec le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna)</small> </td> <td style="text-align: center;"> <b>Pfizer-BioNTech ou Moderna</b><br/>                     ✓<br/>                     En centre de vaccination ou dans mon établissement                 </td> </tr> </table> | <b>AstraZeneca</b><br>✓<br>En centre de vaccination ou dans mon établissement ou chez mon médecin traitant ou en pharmacie<br><small>(sauf si une 1<sup>ère</sup> injection a été réalisée avec le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna)</small> | <b>Pfizer-BioNTech ou Moderna</b><br>✓<br>En centre de vaccination ou dans mon établissement |
| <b>AstraZeneca</b><br>✓<br>En centre de vaccination ou dans mon établissement ou chez mon médecin traitant ou en pharmacie<br><small>(sauf si une 1<sup>ère</sup> injection a été réalisée avec le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna)</small> | <b>Pfizer-BioNTech ou Moderna</b><br>✓<br>En centre de vaccination ou dans mon établissement  |   |  |

### Je suis un professionnel :

- De santé\*
- D'un établissement de santé
- D'un établissement ou service médico-social intervenant auprès de personnes vulnérables
- Salarié de particulier employeur intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables
- Sapeur-pompier



# Ajustement des rappels vaccinaux

- **En population générale :**
  - Pfizer : désormais rappel à 6 semaines (au lieu de 4)
  - Moderna : désormais rappel à 6 semaines (au lieu de 4)
  - AstraZeneca : rappel à 12 semaines
  - Janssen : une seule dose, pas de rappel
- **Chez les personnes « fortement immunodéprimées » :**
  - Maintenir un rappel à 4 semaines et réaliser une 3<sup>ème</sup> dose 4 semaines après la 2<sup>ème</sup> dose ou dès que possible pour les personnes antérieurement vaccinées
- **Chez les personnes de moins de 55 ans ayant reçu une 1<sup>ère</sup> dose d'AstraZeneca :**
  - Rappel avec un vaccin ARNm dans un délai de 12 semaines

# Conduite à tenir en cas de Covid

- **En cas d'antécédent Covid :**
  - Ne réaliser qu'une seule dose aux personnes immunocompétentes avec un délai de 6 mois.
  - Réaliser 2 doses aux personnes immunodéprimées et aux résidents EPHAD après un délai de 3 mois.
- **En cas de Covid dans les jours suivant la 1<sup>ère</sup> dose de vaccin :**
  - Ne réaliser la 2<sup>ème</sup> dose qu'après un délai de 3 mois.

# Vaccination des femmes enceintes

Les femmes enceintes font désormais partie des cibles prioritaires qu'elles aient ou non des comorbidités, avec un vaccin ARNm, et ce à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre de grossesse.

# Vaccination AstraZeneca et thromboses

- En France, 12 cas de thromboses rapportés dont 4 décès après 2 millions de vaccinations.
- En Europe, 62 cas de thromboses veineuse cérébrales et 24 cas de thromboses veineuses digestives dont 18 décès après 25 millions de vaccinations.
- Majoritairement des femmes de moins de 60 ans.
  - **Rapport bénéfice/risque largement favorable.**
  - **Rappeler les signes qui doivent faire consulter : céphalées, douleurs abdominales, vomissements > 3 jours, troubles visuels, purpura.**

# Quelle efficacité des vaccins sur la transmission ?

OUI sans aucun doute et probablement importante.

Mais nécessite le maintien du port du masque en présence de personnes non vaccinées, notamment du fait du risque de rencontrer un variant Sud Africain ou Brésilien.