

Nouvelles recommandations de durée de l'antibiothérapie en pratique de ville

Pr Jean-Marc BOIVIN

15^{ème} Journée Régionale d'Infectiologie

Samedi 25 Septembre 2021

EXIT

10 à 15 jours

8 à 10 jours
10 jours, 14 jours
dans les cas sévères

15 jours à 3 semaines

HAS

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



INFECTIONS CUTANÉES

IMPETIGO



- Localisé peu étendu: **traitement local**: Muciporine



- Formes graves: Ecthyma: hospitalisation

ABCES et FURONCLE



- Abscess : **Incision**
- Ou médical: Clindamycine ou pristinamycine: **5 jours**
- Furuncle isolé: **incision**
- En poussée: Clindamycine ou pristinamycine: **7 jours**

DERMOHYPODERMITE NON NECROSANTE (Erysipèle)



Amoxicilline **7 jours** chez l'adulte



Amoxicilline + Acide
clavulanique **7 jours** chez
l'enfant

Infections ORL

RHINOPHARYNGITE



ANGINE



+



= Amoxicilline 6 jours



+

Score de Mac Isaac >2

Critères	Point
Fièvre > 38°C	1
Absence de toux	1
Adénopathies cervicales antérieures douloureuses ou > 1,5 cm	1
Tuméfaction et/ou exsudat amygdalien	1
Age 3-15 ans	1
Age > 15 ans	-1
Score total	

Pas d'antibiotique

OMA adulte, enfant, nourrisson




- OMA Adulte: Amoxicilline **5 jours**
- OMA congestive ou séro-muqueuse: Pas d'antibiotique
- OMA purulente 3mois à 2ans: Amoxicilline **10 jours**
- OMA purulente >2ans symptômes modérés: Réévaluation à 2-3 jours
- OMA purulente >2ans symptômes importants: Amox pdt **5 jours**
 - Si otorrhée ou otite récidivante: Amoxicilline **10 jours**
- Otite externe: Pas d'antibiotique (niveau de preuve des antibiotiques locaux faible)

RHINOSINUSITE, SINUSITE

- Sinusalgie, Rhinosinusite de l'adulte: Pas d'antibiotique
- Sinusite maxillaire aiguë purulente: Amoxicilline **7 jours**
(Céfuroxime: 5j ou
Pristinamycine 4 jours 2^{ème} intention)
- Sinusite dentaire: Amox+Ac clavulanique **7 jours**
- Sinusite frontale, ethmoïdale, sphénoïdale: Avis ORL (Amox+ AC **7 jours**)
- Sinusite maxillaire ou frontale enfant: Amoxicilline **10 jours**

EABC



INFECTIONS URINAIRES FEMME

- Cystite simple
- Cystite à risque



Fosfomycine: **1 jour**

Amoxicilline
Pivmécillinam
Nitrofurantoina

} **7 jours**

- Cystite grossesse:
- Colonisation bactérienne:
- Pyélonéphrite:



Fosfomycine: **1 jour**

Amoxicilline: **7 jours**

Ciprofloxacin ou lévofloxacin
Antibiogramme puis Amox **10j** si sensible

QUESTIONS A TRANCHER?

- 250 mg AZITHROMYCINE pdt 12 mois dans la BPCO?
- DOXYCYCLINE pdt 3 mois: Acné rosacée
- AUGMENTIN + CORTICOÏDES pdt 15 jours...: otite sero-muqueuse
- DELIVRANCE DES ANTIBIOTIQUES A L'UNITE

