FICHE MÉMO

BON USAGE DES FLUOROQUINOLONES (FQ) EN SOINS PRIMAIRES

Inspiré d'un document réalisé par l'EMA de Corbeil-Essonnes

En 1ère intention, traitement probabiliste des

Pyélonéphrites aiguës simples

Infections urinaires masculines fébriles (prostatites)



Orchi-épididymites sans facteur de risque d'IST



En l'absence d'exposition aux fluoroquinolones dans les 6 derniers mois

AUCUNE INDICATION DANS LA CYSTITE (HOMME ET FEMME)

EFFETS INDÉSIRABLES

Effets musculo-squelettiques
Tendinopathie et rupture tendineuse

Effets cardio vasculaires
Allongement de l'intervalle QT et dissection aortique

Effets neurologiques
Neuropathies périphériques, convulsions et risque confusiogène

Impact sur le microbiote
Infections à *Clostridioïdes difficile* et résistance

Photo-sensibilisation

INFORMER LE PATIENT DES SIGNES D'ALERTE

Déclaration de tout effet secondaire au centre de pharmacovigilance et au CRPV de votre territoire

Consultation médicale rapide en cas d'effets indésirables

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie/hypersensibilité
- Antécédents d'effets indésirables tendineux suite à la prise de FQ (tendinopathie ou rupture tendineuse)
- Troubles neurologiques (épilepsie)
- Allaitement
- Troubles du rythme cardiaque et allongement du QT
- Enfants ou adolescents

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Insuffisance rénale
- Grossesse (cf. CRAT)
- Personne âgée
- Traitement par AVK
- Antécédents cardiaques (anévrisme, dissection aortique, valvulopathies)

Risque accru d'effets indésirables chez les patients âgés, les insuffisants rénaux et en cas d'associations avec les corticoïdes (à éviter).

Précaution sur l'utilisation concomitante de topique digestif, sucralfate, sel de fer et calcium (dont produits laitiers). Pas d'exposition au soleil + protection solaire indice 50.

MISE AU POINT SUR LE BON USAGE DES FLUORO-QUINOLONES

Actualisation 2025 de la SPILF et du GPIP - ScienceDirect

Copyright : CRAtb Grand Est. 10/2026