

Les points forts






**Prise en charge
des patients
infectés par le
VIH**

**Rapport
« YENI »**

- 130 000 pts VIH+
- 7000 contaminations/an (50% d'Afrique)
- 65% succès thérapeutique
- Pas ttt intermittent
- EI : lipodystrophie, risque cardio-vasc.
- Co-infections VIH-VHC
- Cancers : poumon, tube dig.
- TMF < 1 %
- CISIH → COREVIH

Prise en charge multidisciplinaire

INHIBITEURS NUCLEOS(T)IDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)

NOM COMMERCIAL, DCI, LABORATOIRE	VISUEL CP / GÉLULE	DOSAGE ET POSOLOGIE ADULTE	PLANNIFICATION DES PRISES
COMBIVIR® (<i>zidovudine et lamivudine, CBV</i>) GlaxoSmithKline		Un comprimé (contenant 300 mg d'AZT et 150 mg de 3TC) deux fois par jour	
EMTRIVA® (<i>emtricitabine, FTC</i>) Gilead Sciences		Une gélule dosée à 200 mg une fois par jour	
EPIVIR® (<i>lamivudine, 3TC</i>) GlaxoSmithKline		Un comprimé à 150 mg deux fois par jour ou un comprimé à 300 mg une fois par jour	
KIVEXA® (<i>abacavir et lamivudine</i>) GlaxoSmithKline		Un comprimé (contenant 600 mg d'abacavir et 300 mg de lamivudine) une fois par jour	
RETROVIR® (<i>zidovudine, AZT ou ZDV</i>) GlaxoSmithKline		Une gélule dosée à 300 mg deux fois par jour	
TRIZIVIR® (<i>zidovudine, lamivudine et abacavir, TZV</i>) GlaxoSmithKline		Un comprimé (contenant 300 mg d'AZT, 300 mg d'abacavir et 150 mg de 3TC) deux fois par jour	
TRUVADA™ (<i>ténofovir et emtricitabine, TVD</i>) Gilead Sciences		Un comprimé (contenant 300 mg de ténofovir DF et 200 mg d'emtricitabine) une fois par jour	
VIDEX® (<i>didanosine ou ddl</i>) Bristol-Myers Squibb		Une gélule dosée à 250 mg, une fois par jour (poids inférieur à 60 kg), ou une gélule dosée à 400 mg, une fois par jour (poids supérieur ou égal à 60 kg)	
VIREAD® (<i>ténofovir, TDF</i>) Gilead Sciences		Un comprimé dosé à 300 mg de TDF par jour	
ZIAGEN® (<i>abacavir, ABC</i>) GlaxoSmithKline		Un comprimé dosé à 300 mg deux fois par jour ou 2 comprimés à 300 mg une fois par jour	


INHIBITEURS NON NUCLEOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)

SUSTIVA® (efavirenz, EFV) Bristol-Myers Squibb		Un comprimé dosé à 600 mg une fois par jour	
VIRAMUNE® (névirapine, NVP) Boehringer Ingelheim		Un comprimé dosé à 200 mg une fois par jour les 14 premiers jours, puis ensuite deux fois par jour.	

INHIBITEURS DE FUSION

FUZEON® (enfuvirtide, T-20) Roche		Une injection de 90 mg (1mL) deux fois par jour en injection sous-cutanée	
--	--	---	--

INHIBITEURS DE LA PROTEASE

<p>APTIVUS® (tipranavir, TPV) Boehringer Ingelheim</p>		<p>Deux capsules dosées à 250 mg deux fois par jour (boostées avec deux capsules de Norvir® à chaque prise)</p>	
<p>CRIXIVAN® (indinavir, IDV) Merck, Sharp & Dohme</p>		<p>Deux gélules dosées à 400 mg deux fois par jour ou une gélule de 200 mg et une gélule de 400 mg deux fois par jour (boostées avec une capsule de Norvir® à chaque prise) ATTENTION : POSOLOGIE À ADAPTER EN FONCTION DES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES</p>	<p>ou</p> 
<p>INVIRASE® (saquinavir, SQV) Roche</p>		<p>Deux comprimés dosés à 500 mg deux fois par jour (boostés avec une capsule de Norvir® à chaque prise)</p>	
<p>KALETRA® (lopinavir, ritonavir, LPV/RTV) Abbott</p>		<p>Trois capsules* (contenant 133,3 mg de lopinavir et 33,3 mg de ritonavir) deux fois par jour * Une adaptation posologique à 4 capsules 2 fois par jour est nécessaire chez les patients qui sont traités par Kaletra + INNTI.</p>	
<p>NORVIR® (ritonavir, RTV) Abbott</p>		<p>Une capsule dosée à 100 mg en booster* de chaque prise d'antiprotéase * Pour augmenter la concentration des molécules prises en association</p>	<p>Posologie en fonction de l'antiprotéase utilisée</p>
<p>REYATAZ® (atazanavir, ATV) Bristol-Myers Squibb</p>		<p>Deux gélules dosées à 150 mg* une fois par jour (boostées avec une capsule de Norvir®) * à 200 mg en cas d'association à Sustiva</p>	
<p>TELZIR® (fosamprenavir, FPV) GlaxoSmithKline</p>		<p>Un comprimé dosé à 700 mg deux fois par jour (boosté avec une capsule de Norvir® à chaque prise)</p>	
<p>VIRACEPT® (nelfinavir, NFV) Roche</p>		<p>Trois comprimés trois fois par jour ou cinq comprimés deux fois par jour</p>	<p>ou</p> 



Et en 2007-2008...

■ Nouveaux NNRTI : Etravirine, Rilpivirine

■ Nouveaux IP : Darunavir, Brecanavir

■ Inhibiteurs d'entrée

AntiCCR5 : Maraviroc, Vicriviroc

Ac monoclonal anti-CD4 : TNX 355

■ Inhibiteurs d'intégrase :

MK 0518

■ Inhibiteurs maturation :

PA 457

