

Tableau de recommandations de bon usage des Antifongiques : 23 Mars 2007

	<i>Aspergillose disséminée ou profonde</i>	<i>Candidose disséminée ou profonde</i>	<i>Traitement empirique chez le neutropénique fébrile</i>	<i>Prophylaxie primaire en Onco-hématologie</i>	<i>Prophylaxie secondaire aspergillose chez immunodéprimé (héματο-greffé)</i>	<i>Autres</i> - <i>Leishmaniose</i> - <i>Mucormycose</i> - <i>Cryptococcose</i>
Indications du fluconazole (Triflucan®)		Oui (AMM) si Candida fluco S : ttd de 1 ^{ère} intention		Oui (AMM)		Cryptococcose
Indications reconnues (AMM) ou protocoles thérapeutiques définis par l'AFSSAPS, la HAS ou l'INCA	Ambisome® - E* : 3 mg/kg/24h - A** : 3 mg/kg/24h	Ambisome® (si candida flucoR *** et insuffisance rénale) A** et E*	Ambisome® (si agents néphrotoxiques associés)	Noxafil® 200 mg x 3/j		Ambisome® - Leishmaniose - Cryptococcose
	V Fend® - A** : 6 mg/kg/12h à J1 puis 4 mg/kg/12h	V Fend® (si candida flucoR)				V Fend® - Scedosporium - Fusarium
	Si échec ou intolérance à AmB, Ambisome, itraconaz. Cancidas® - A** : 70 mg à J1 puis 50 mg (> 80 kg : 70 mg) Ou Noxafil® - A** : 400 mg x 2/j	Cancidas® (si candida flucoR)*** - A** : 70 mg à J1 puis 50 mg (> 80 kg : 70 mg)	Cancidas® - A** : 70 mg à J1 puis 50 mg (> 80 kg : 70 mg)			Noxafil® - Fusariose - Chromoblastomycose - Mycétome - Coccidioïdomycose
Indications validées scientifiquement (sociétés savantes, publications internationales dans revue à comité de lecture)	Association si signes majeurs de gravité (aspergillose prouvée ou présumée) : - Cancidas® + Ambisome® ou V Fend®	Cancidas® Endophtalmie fluco R			V Fend® Ambisome®	Ambisome® Mucormycose 10 mg/kg/j
	V Fend® E* > 2 ans : IV : 7 mg/kg/12h VO : 200 mg/12h					
	Cancidas® Enfant					
Indications non validées		V Fend® C. oesophagienne		Ambisome®		
		Cancidas® C. oesophagienne Candidose chez l'enfant		V Fend®		
				Cancidas®		

* E = Enfant ** A = Adulte *** = Proposition conférence consensus