

Anti-staphyloccocciques : évolution des consommations au CHU de Nancy

Commission Spécialisée des Antibiotiques

26 mars 2013


Béatrice Demoré

Consommation totale d'antibiotiques de 2009 à 2012 en DDJ/1000 JH




Penicilline M = Cloxacilline

Evolution de la consommation des antibiotiques




Consommation des Glycopeptides

Evolution de la consommation des antibiotiques




Consommation de Linezolide

Evolution de la consommation des antibiotiques




Répartition Vancomycine/Teicoplanine et Linézolide

Evolution de la consommation des antibiotiques




Daptomycine de 2010 à 2012

Evolution de la consommation des antibiotiques




Répartition Vancomycine/Teicoplanine Linézolide et Daptomycine

Evolution de la consommation des antibiotiques




Glycopeptides

Comparaison entre établissements




Daptomycine

Comparaison entre établissements



Linezolid

Comparaison entre établissements



Conclusion

- Consommations anti-staphylococciques stables et même en baisse
- Daptomycine à surveiller
 - Prescription encadrée
- Intérêt de l'outil ConsoRes



Consommation & résistance aux bactéries



Consommation
des antibiotiques



Résistance
bactérienne



Analyse croisée
Consommation
et résistance



Rapports



CONNEXION

Identification utilisateur

sandrine.clinicien



SE DÉCONNECTER

INSCRIPTION

→ DONNÉES

Importer | Exporter